

برای دیدن این مطلب به <https://www.babyandme-ir.nestle.com> مراجعه کنید.

این مطلب در ادامه با شما در میان خواهد آمد.

## توجه: این مطلب صرفاً جهت آگاهی شماست و جایگزین توصیه پزشک نیست.

این مطلب به شما می‌گوید که چگونه می‌توانید با رعایت این نکات، سلامت خود و فرزندتان را تضمین کنید.

اگر فرزندتان در طول شیر خوردن مدام بیقرار و گریه می‌کند، ممکن است به دل‌درد مبتلا باشد. دل‌درد یکی از شایع‌ترین مشکلات گوارشی نوزادان است. این حالت معمولاً در ماه اول پس از تولد رخ می‌دهد. اگر فرزند شما بیش از ۳۰ دقیقه در طول یک وعده شیر خوردن گریه می‌کند، به دل‌درد مبتلاست. این گریه‌ها معمولاً در نیمه بعد از ظهر یا شب اتفاق می‌افتد.

اگر فرزندتان در طول شیر خوردن احساس بی‌قراری می‌کند، ممکن است به نفیسه مبتلا باشد. نفیسه در طول شیر خوردن رخ می‌دهد و با بی‌قراری و گریه همراه است. این حالت در ماه اول پس از تولد شایع است. اگر فرزند شما بیش از ۳۰ دقیقه در طول یک وعده شیر خوردن بی‌قرار است، به نفیسه مبتلاست.

اگر فرزندتان در طول شیر خوردن احساس بی‌قراری می‌کند، ممکن است به اسهال مبتلا باشد. اسهال در طول شیر خوردن رخ می‌دهد و با بی‌قراری و گریه همراه است. این حالت در ماه اول پس از تولد شایع است. اگر فرزند شما بیش از ۳۰ دقیقه در طول یک وعده شیر خوردن بی‌قرار است، به اسهال مبتلاست.

اگر فرزندتان در طول شیر خوردن احساس بی‌قراری می‌کند، ممکن است به دل‌درد مبتلا باشد. دل‌درد یکی از شایع‌ترین مشکلات گوارشی نوزادان است. این حالت معمولاً در ماه اول پس از تولد رخ می‌دهد. اگر فرزند شما بیش از ۳۰ دقیقه در طول یک وعده شیر خوردن گریه می‌کند، به دل‌درد مبتلاست.

اگر فرزندتان در طول شیر خوردن احساس بی‌قراری می‌کند، ممکن است به دل‌درد مبتلا باشد. دل‌درد یکی از شایع‌ترین مشکلات گوارشی نوزادان است.

**Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.**